



**INVESTIGACIÓN ENFERMERA SOBRE LA PREVALENCIA DE NIÑOS QUE
PADECEN HIPOACUSIA**

Autor: Elena María Cruz Morales

Coautor: Beatriz Valdayo Rosado, Rocío Martín Almenta

INTRODUCCIÓN

La hipoacusia se trata de una sordera debido a que se ha producido una pérdida o hay una alteración del sistema auditivo que como resultado da una incapacidad de audición y como consecuencias problemas para ejercitar el habla.

OBJETIVOS

Determinar la prevalencia y las manifestaciones presentes en pequeños que padecen hipoacusia

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio descriptivo observacional transversal con una muestra de 500 niños entre 0-2 años nacidos en distintos hospitales.

El estudio fue realizado mediante la lectura y datos informativos del sistema de salud por screening transversal.

RESULTADOS

De esos 500 niños nacidos sólo 3 de ellos padecían sordera. Ésta puede venir de diferentes factores como origen genético, pero la mayoría de casos suceden en familias oyentes. Las manifestaciones presentes en estos casos es la falta de respuesta ante estímulos ruidosos, falta de reconocimiento de la voz de los padres, no balbuceo en su edad, no entendimiento de las palabras y por tanto ausencia de expresión ante la emisión de las mismas. En cuanto al estado anímico, estos niños suelen mostrarse tristes con síntomas de frustración, con cierto grado de timidez, con cansancio o mal comportamiento. Existen pequeñas pruebas para la detección de hipoacusia siendo esencial evaluaciones constantes a lo largo de la evolución del pequeño.

CONCLUSIONES

La hipoacusia en niños es un trastorno que puede de aparecer en un porcentaje determinado. Este trastorno puede provocar un efecto negativo en el aprendizaje de la comunicación oral del pequeño teniendo consecuencias negativas a nivel escolar, educacional y su calidad de vida en general. Por ello, es esencial que los padres y profesionales sanitarios nos aseguremos del que el niño no padezca esta dificultad o tener

PALABRAS CLAVES

Hipoacusia, sordera, niños, enfermería.