




USO FARMACOLÓGICO EN TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO (TGD) EN HUELVA.



Autores: Reina Domínguez, María; Silva Rodríguez, Jesús; González Macías, Carmen; Fernández León, Sandra; Rodríguez Martínez, Ana.
 Contacto: marreidom@gmail.com

INTRODUCCIÓN



Dadas las características descritas en este tipo de trastorno, muchos de los niños que lo padecen se benefician de las intervenciones llevadas a cabo por los equipo de Atención Temprana.

Dentro de los TGDs, hay un amplio abanico de diagnósticos, que albergan desde categorías con buen pronóstico y rendimiento (como el Síndrome de Asperger) a categorías de más difícil manejo y peor pronóstico (como las Psicosis Desintegrativas). Es por esto que dentro de la importancia de una atención integral, tenemos que considerar el tratamiento psicofarmacológico como una herramienta más en el abordaje de estos niños.

OBJETIVO

Estudiar el uso de tratamiento psicofarmacológico en niños diagnosticados de TGD en Huelva.

METODOLOGÍA

Cogemos una muestra de niños que han sido atendidos por psiquiatría en la Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil de Huelva en el periodo comprendido entre enero 2015 y enero 2016 en consulta, con diagnóstico de TGD. Llevamos a cabo un estudio observacional y transversal del sexo, edad y toma de tratamiento de todos ellos.

RESULTADOS

Estudiamos una **muestra de 47 niños diagnosticados de TDG**. Podemos observar que la **prevalencia masculina** es mucho mayor que la femenina en este tipo de trastorno, con una proporción de 5.7:1. Las edades comprendidas en nuestra muestra eran de entre 6 y 17 años, con una media de 11 años. De los 47 niños, 15 de ellos se mantienen sin prescripción farmacológica alguna, mientras que 32 de ellos han precisado tratamiento con **neurolépticos (19)** y **estimulantes (15)** principalmente.



CONCLUSIONES

Los datos relacionados con la prevalencia según el sexo en TGD son concordantes con la bibliografía existente respecto a este tema, aunque con una proporción hombre: mujer algo aumentada.

El **68% de los niños atendidos han precisado tratamiento** para control de algunas de las áreas afectadas por su trastorno.

Los fármacos más usados han sido:

- Neuroléptico**, indicados principalmente para los trastornos de conducta/agresividad
- Estimulantes**, para problemas relacionados con el área de la atención e hiperactividad.

DISCUSIÓN

Para poder llevar a cabo un abordaje integral, es necesario en muchos casos el uso de psicofármacos en niños con TGD.

El porcentaje de niños en tratamiento psicofarmacológico puede estar aumentado, puesto que se trata tan solo de aquellos que son vistos por psiquiatría, muchos de ellos derivados directamente a este especialista dada la gravedad y necesidad de tratamiento psicofarmacológico una vez que otras medidas han fracasado en el control y abordaje de los síntomas, o no son suficientes por sí solas.

Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual de la Cuenca Minera.

www.congresoaspromin.org

Lugar de edición: Huelva.

Edita: ASPROMIN. 2017

